

QI- Nummer	Bezeichnung	Zähler/Nenner	Referenz- bereich
02-002	Rehabilitation – Physio-/ Ergotherapie	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Fälle mit Paresen und deutlicher Funktionseinschränkung (operationalisiert durch Rankin-Skala <math>\geq 3</math> oder Barthel-Index <math>\leq 70</math> innerhalb von 24 h nach Aufnahme) und mit einer Liegezeit von mindestens einem Tag [unter Ausschluss von Fällen mit TIA und Fällen mit komatöser Bewusstseinslage bei Aufnahme]</p> <p><u>Merkmal:</u> Fälle mit Untersuchung oder Behandlung durch Physio- / Ergotherapeuten bis zum Tag 2 nach Aufnahme</p>	$\geq 90\%$
03-002	Rehabilitation – Logopädie	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Fälle mit Aphasie / Dysarthrie / Dysphagie bei Aufnahme mit einer Liegezeit von mindestens einem Tag [unter Ausschluss von Fällen mit TIA und Fällen mit komatöser Bewusstseinslage bei Aufnahme]</p> <p><u>Merkmal:</u> Fälle mit Untersuchung oder Behandlung durch Logopäden bis zum Tag 2 nach Aufnahme</p>	$\geq 90\%$
04-003	Therapie – Thrombozyten- aggregationshemmer	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Fälle mit Alter <math>\geq 18</math> Jahren mit TIA oder Hirninfarkt [unter Ausschluss von Fällen mit Antikoagulation oder Intervall Ereignis - Aufnahme <math>&gt; 48</math> h] und mit einer Liegezeit von mindestens einem Tag</p> <p><u>Merkmal:</u> Fälle unter Therapiebeginn mit Thrombozytenaggregationshemmern innerhalb der ersten 48 h nach Ereignis</p>	$\geq 95\%$
05-002	Sekundärprophylaxe – Thrombozyten- aggregationshemmer	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Fälle mit Alter <math>\geq 18</math> Jahren mit TIA oder Hirninfarkt [unter Ausschluss von Verstorbenen oder Fällen mit Antikoagulation] und mit einer Liegezeit von mindestens einem Tag</p> <p><u>Merkmal:</u> Fälle unter Therapie mit Thrombozytenaggregationshemmern bei Entlassung/Verlegung</p>	$\geq 95\%$
06-001	Sekundärprophylaxe – Antikoagulation bei Vorhofflimmern	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Mobile bzw. geringgradig beeinträchtigte Fälle (operationalisiert über 2 Items des Barthel-Index bzw. Rankin-Skala bei Entlassung) mit TIA oder Hirninfarkt und Vorhofflimmern und einem Alter <math>\geq 18</math> Jahre, die nach Hause oder in eine Rehabilitationseinrichtung entlassen wurden</p> <p><u>Merkmal:</u> Fälle mit therapeutischer Antikoagulation bei Entlassung / Verlegung oder mit Empfehlung zur Antikoagulation im Entlass- / Verlegungsbrief</p>	$\geq 80\%$

07-002	Mobilisation	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Fälle mit einer Liegezeit von mindestens einem Tag, die beim Lagewechsel Bett-Stuhl Unterstützung benötigen (Barthel-Index 0 - 10) [unter Ausschluss von Fällen mit TIA oder mit Beatmung oder mit Hirndruck oder mit komatöser Bewusstseinslage bei Aufnahme]</p> <p><u>Merkmal:</u> Fälle, die innerhalb der ersten beiden Tage nach Aufnahme mobilisiert wurden</p>	>=90%
09-001	Frühzeitige Gefäßdiagnostik	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Alle Fälle mit TIA oder Hirninfarkt</p> <p><u>Merkmal:</u> Fälle mit extra- oder intrakranieller Hirngefäßdiagnostik (Dopplersonographie / Duplexsonographie / DSA / CT-Angiographie / MR-Angiographie) innerhalb von 48h</p>	>=80% <b>(NEU)</b>
10-003	Todesfälle bei Patienten mit Hirninfarkt	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Fälle mit Hirninfarkt ohne Patientenverfügung [unter Ausschluss von vor dem siebten Tag in andere Abteilungen, Kliniken, Rehabilitations- oder Pflegeeinrichtungen verlegte Fälle]</p> <p><u>Merkmal:</u> Innerhalb der ersten 7 Tage des Krankenhausaufenthaltes Verstorbene</p> <p><u>Risikofaktoren zu Adjustierung:</u> Geschlecht, Alter, Versorgung prestroke, NIHSS, Diabetes mellitus, Vorhofflimmern, Früherer Schlaganfall</p>	Nicht definiert
11-003	Pneumonie bei Patienten mit Hirninfarkt	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Alle Fälle mit Hirninfarkt</p> <p><u>Merkmal:</u> Fälle mit Pneumonie als Komplikation</p> <p><u>Risikofaktoren zu Adjustierung:</u> Geschlecht, Alter, Versorgung prestroke, NIHSS, Diabetes mellitus, Vorhofflimmern, Früherer Schlaganfall, Schluckbeschwerden</p>	Nicht definiert
12-003	Screening für Schluckstörungen	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Alle Fälle mit einer Liegezeit von mindestens einem Tag [unter Ausschluss von Fälle mit TIA oder Bewusstseinsstörungen bei Aufnahme sowie Fällen in denen ein Schlucktest nicht durchführbar ist]</p> <p><u>Merkmal:</u> Fälle mit nach Protokoll durchgeführtem Schlucktest*</p>	>=90%

13-004	Erste Bildgebung	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Fälle im Alter von 18 - 80 Jahren mit einem Zeitintervall Ereignis-Aufnahme <math>\leq 4</math>h und nicht zu hohem Schweregrad (NIHSS <math>\leq 25</math>) zur Durchführung einer Thrombolysetherapie (ohne Patienten mit Bildgebung vor Aufnahme)</p> <p><u>Merkmal:</u> Fälle mit Bildgebung bis <math>\leq 30</math> Minuten nach Aufnahme</p>	<b><math>\geq 70\%</math> (NEU)</b>
14-003	Thrombolyse	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Fälle mit Hirninfarkt im Alter von 18 - 80 Jahren mit einem Zeitintervall Ereignis-Aufnahme <math>\leq 4</math> h und nicht zu hohem Schweregrad (NIHSS <math>\leq 25</math>) zur Durchführung einer Thrombolysetherapie [unter Ausschluss von Fällen mit ausschließlich intraarterieller Lyse bzw. ausschließlich mechanischer Rekanalisation]</p> <p><u>Merkmal:</u> Fälle mit intravenöser Thrombolysetherapie</p>	<b><math>\geq 35\%</math> (NEU)</b>
15-002	Behandlung in Stroke-Unit	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Fälle mit Hirninfarkt oder TIA, die mit Intervall Ereignis-Aufnahme <math>\leq 24</math> h in die Klinik aufgenommen werden</p> <p><u>Merkmal:</u> Behandlung auf Stroke-Unit</p>	<b><math>\geq 85\%</math> (NEU)</b>
16-001	Door-to-needle-time	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Fälle mit Hirninfarkt und intravenöser Thrombolyse</p> <p><u>Merkmal:</u> Fälle mit „door-to-needle-time“ <math>\leq 1</math> h</p>	<b><math>\geq 90\%</math></b>
17-001	Karotisrevaskularisierung bei symptomatischer Karotisstenose	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Fälle mit Diagnose Hirninfarkt oder TIA mit Nachweis symptomatischer Karotisstenose <math>\geq 70\%</math> und <math>&lt; 100\%</math>; Rankin Scale bei Entlassung <math>\leq 3</math></p> <p><u>Merkmal:</u> Fälle, die zur Durchführung einer Revaskularisierung innerhalb <math>\leq 14</math> Tagen nach Aufnahme verlegt werden oder bei denen eine Revaskularisierung durchgeführt wurde</p>	<b><math>\geq 60\%</math> (NEU)</b>
18-001	Sterblichkeit nach Thrombolyse	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Fälle mit Hirninfarkt ohne Patientenverfügung und intravenöser Thrombolyse (unter Ausschluss von Fällen mit intraarterieller Thrombolyse bzw. mechanischer Rekanalisation)</p> <p><u>Merkmal:</u> Fälle mit Entlassungsstatus verstorben</p> <p><u>Risikofaktoren zu Adjustierung:</u> Geschlecht, Alter, Versorgung prestroke, NIHSS, Diabetes mellitus, Vorhofflimmern</p>	Nicht definiert

19-001	Entlassungsziel Rehabilitation von Patient(inn)en mit alltagsrelevanten Behinderungen	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Fälle ohne vorherige Pflegeheimunterbringung mit Rankin Skala 2-5 bei Entlassung [ausgeschlossen sind Verlegungen in eine andere Akutklinik oder Abteilung]</p> <p><u>Merkmal:</u> Fälle, für die nach Entlassung eine ambulante oder stationäre medizinische Rehabilitation (nach § 40 SGB V) von der Klinik veranlasst wurde (Organisation oder Anmeldung; nicht notwendigerweise direkte Verlegung in die Rehabilitation)</p>	<b>&gt;=70% (NEU)</b>
20-001	Sekundärprävention - Antihypertensiva bei Entlassung	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Alle Patienten mit Diagnose Hirninfarkt / TIA und Komorbidität Hypertonie [unter Ausschluss von Verstorbenen]</p> <p><u>Merkmal:</u> Patienten mit Indikation für eine blutdrucksenkende Therapie, die zum Entlassungszeitpunkt ein Antihypertensivum erhielten oder denen ein antihypertensives Medikament verordnet oder empfohlen wurde</p>	<b>&gt;=95% (NEU)</b>
21-001	Sekundärprävention – Statin-Gabe bei Hirninfarkt	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Alle Patienten mit Diagnose Hirninfarkt / TIA</p> <p><u>Merkmal:</u> Patienten, die zum Entlassungszeitpunkt ein Statin erhielten oder denen ein Statin verordnet oder empfohlen wurde</p>	<b>&gt;=80% (NEU)</b>
22-001	VHF-Diagnostik	<p><u>Grundgesamtheit:</u> Patienten ohne vorbekanntes Vorhofflimmern mit HI oder TIA</p> <p><u>Merkmal:</u> Patienten mit während des stationären Aufenthaltes durchgeführter Rhythmusdiagnostik</p>	<b>&gt;=80% (NEU)</b>